



فيفري 2022

المستوى: الثالثة علوم تجريبية

المدة : ساعتين.

فرض الفصل الثاني في مادة الرياضيات

التمرين 1

في كل مما يلي توجد اجابة صحيحة واحدة ، عينها مع التبرير:

$$\ln(x+2) + \ln(x-1) \leq 2 \ln 2 \quad \text{(أ) مجموعة حلول المتراجحة :}$$

$$(1) \quad [-2; 1] \quad ; \quad (2) \quad [1; 2] \quad ; \quad (3) \quad [-3; 2]$$

$$(ب) \text{ نعتبر المعادلة التفاضلية : } 3y - y' = 6 \quad \dots (E)$$

الحل الخاص للمعادلة (E) الذي يحقق : $f(-1)=0$ هو :

$$(1) \quad f(x) = -2e^{3(x+1)} + 2 \quad ; \quad (2) \quad f(x) = -2e^{3x+1} + 2$$

$$(3) \quad f(x) = 3e^{2(x-1)} - 2$$

(ج) دالة معرفة و قابلة للإشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ حيث :

$$f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x}, \quad \text{الدالة المشتقة للدالة } f \text{ معرفة ب:}$$

$$(1) \quad f'(x) = 2 \left(\frac{\ln(x^3+1)}{x(\ln x)^2} \right) \quad ; \quad (2) \quad f'(x) = 2 \left(\frac{(\ln x)^3+1}{x(\ln x)^2} \right)$$

$$(3) \quad f'(x) = 2 \left(\frac{(\ln x+1)^3}{x(\ln x)^2} \right)$$

التمرين 2(I) لتكن الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي: $g(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln x$ و ليكن (C_g) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (1) ادرس تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.(2) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.5 < \alpha < 2$.(3) استنتج اشارة $g(x)$ حسب قيم x .(II) لتكن الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{\ln x}{x^2+1}$ و ليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوي منسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$

(1) أ) احسب النهايات عند حدود مجموعة التعريف ، فسر النتائج هندسيا.

ب) بين انه من اجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن : $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2+1)^2}$

ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) بين أن $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$ و استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$.

(3) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(4) ارسم (T) و (C_f) .

(5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة :

$$f(x) = \frac{1}{2}x + m$$

III) لتكن الدالة h المعرفة على $]0; +\infty[$ كما يلي : $h(x) = \frac{|\ln x|}{x^2+1}$

اشرح كيف يمكن رسم (C_h) منحنى الدالة h اعتمادا على (C_f)

بالتوفيق.

التصحيح النموذجي

العلامة	الحل	رقم التمرين
	أ) مجموعة حلول المتراجحة : $\ln(x+2) + \ln(x-1) \leq 2 \ln 2$ (3) $[-3; 2]$ ب) نعتبر المعادلة التفاضلية : $3y - y' = 6 \dots (E)$ الحل الخاص للمعادلة (E) الذي يحقق : $f(-1)=0$ هو : $f(x) = -2e^{3(x+1)} + 2$ (1) ج) دالة معرفة و قابلة للإشتقاق على المجال $]0; +\infty[$ حيث : $f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x}$ ، الدالة المشتقة للدالة f معرفة ب: $f'(x) = 2 \left(\frac{(\ln x)^3 + 1}{x(\ln x)^2} \right)$ (2)	التمرين 1

(I) تغيرات الدالة g ثم شكل جدول تغيراتها.
النهايات

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1+x^2 = 1 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} 2x^2 \ln x = 0 \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{1}{x^2} + 1 - 2 \ln x \right) = -\infty$$

الدالة المشتقة

$$g'(x) = 2x - 2 \left(2x \ln x + \frac{1}{x} x^2 \right) = 2x - 4x \ln x - 2x = -4x \ln x$$

إشارة الدالة المشتقة

$$\text{من أجل } x \in]0; 1[\text{، } \ln x < 0 \text{ ومنه } g'(x) > 0$$

$$\text{ومن أجل } x \in]1; +\infty[\text{، } \ln x > 0 \text{ ومنه } g'(x) < 0$$

اتجاه التغير

بالتالي الدالة g متزايدة تماماً على المجال $]0; 1[$ و متناقصة تماماً على المجال $]1; +\infty[$

جدول التغيرات

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$		0	
$g(x)$	1	2	$-\infty$

(2) نبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1.5 < \alpha < 2$.
مبرهنة القيم المتوسطة

(3) استنتاج إشارة $g(x)$ حسب قيم x .

x	0	α	$+\infty$
$g(x)$	+	0	-

(II) 1 أ) حساب النهايات عند حدود مجموعة التعريف و تفسير النتائج هندسيا.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{x^2 + 1} = 0 ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$$

تفسير النتائج هندسيا.

لدينا $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ إذن (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $x = 0$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ إذن (C_f) يقبل مستقيم مقارب معادلته $y = 0$ (محور الفواصل) بجوار $+\infty$.

ب) نبين انه من اجل كل x من $]0; +\infty[$ فإن :

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2+1)^2}$$

لدينا من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $]0; +\infty[$ ، $x(x^2+1)^2 > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ هي نفس إشارة $g(x)$.

إذن الدالة f متزايدة تماما على المجال $]0; \alpha]$ ومتناقصة تماما على المجال $[\alpha; +\infty[$.

جدول التغيرات

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	$-\infty$	$f(\alpha)$	0


(2) نبين أن $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$

حصر للعدد $f(\alpha)$ $0,12 < f(\alpha) < 0,23$

(3) معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(1) $y = f'(1)(x-1) + f(1)$ ومنه $y = \frac{1}{2}(x-1)$

(4) رسم (T) و (C_f) .



5. المناقشة بيانياً، حسب قيم الوسيط الحقيقي

m ، عدد حلول المعادلة: $f(x) = \frac{1}{2}x + m$.

إذا كان $m < -\frac{1}{2}$ فإن المعادلة تقبل حلين.

إذا كان $m = -\frac{1}{2}$ فإن المعادلة تقبل حلاً واحداً مضاعفاً.

إذا كان $m > -\frac{1}{2}$ فإن المعادلة ليس لها حلول.

(III) الشرح كيف يمكن رسم (C_h) منحنى الدالة h اعتماداً على (C_f)

$$\begin{cases} h(x) = f(x); x \in [1; +\infty[\\ h(x) = -f(x); x \in]0; 1] \end{cases}$$

على المجال $[1; +\infty[$ يكون (C_h) منطبقاً على (C_f)

على المجال $]0; 1]$ يكون (C_h) نظيراً (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل.

